AB JP 03167132 A UPAB: 19930928

An oral compsn for periodontal and pharyngeal diseases contains low polar substances extracted from Pogostemon cablin Bentham with steam distn.

USE/ADVANTAGE - The drug is active against oral bacterial, esp

Streptococcus pyogenes and is used for prevention and treatment of

periodonal diseases and pharyngeal inflammation.

In an example, chewing gum comprises 20.0 wt% of gum base, 55.0 wt% of sugar, 15.0 wt% of glucose, 9.3 wt% of millet jelly, 0.5 wt% of flavour and 0.2 wt% of steam distillate of Pogostemon cablin.

0/0

ACCESSION NUMBER: 1991-256638 [35] WPIDS

DOC. NO. CPI:

C1991-111310

TITLE:

Oral compsn. contg. Pogostemon cablin extracts - for

treating periodontal and pharyngeal diseases, e.g.

Streptococcus pyogenes.

DERWENT CLASS:

B04 D21

PATENT ASSIGNEE(S): (LOTT) LOTTE CO LTD

COUNTRY COUNT: 1
PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE WEEK LA PG

JP 03167132 A 19910719 (199135)\*

**APPLICATION DETAILS:** 

PATENT NO KIND

APPLICATION DATE

JP 03167132 A

JP 1989-306571 19891128

PRIORITY APPLN. INFO: JP 1989-306571 19891128

steam distillation votatile companies.

### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-167132

®Int. Cl. 5 A 61 K

ACK Q

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成3年(1991)7月19日

35/78 A 23 G 3/00 3/30 A 61 K 7/16

8412-4C 101 8114 - 4B8114-4B 7252-4C

> 審查請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 口腔用組成物

> 20特 願 平1-306571

22出 願 平1(1989)11月28日

720発明 Ш 者 丸

耊

東京都日野市豊田2-34-1

明 松 本 冗発 者

照 夫 東京都東久留米市滝山6-3-14-107

⑫発 明 者 大 澤 謙 埼玉県与野市上峰 1-12-12-403 東京都新宿区西新宿3丁目20番1号

株式会社ロッテ の出 願 人 個代 理 人

弁理士 浜田 治雄

## ΔE

- 1. 発明の名称 口腔用組成物
- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 協周病および咽の炎症予防に有効な口腔用 組成物であって、カッコウ (Pogostenon cablin Benthamの地上部)から水蒸気蒸留に より抽出した低極性物質を有効成分として含 有することを特徴とする口腔用組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、天然植物起源の有効成分を含有 する口腔用組成物に関し、更に詳しくは、口 腔内に存在する歯周病原菌や咽頭内に存在す る化膜レンサ球菌に作用し、それらの細菌の . 生育を抑制して歯周病および咽の炎症の予防 を図る口腔用組成物に関する。

[従来の技術]

騒蝕と毎周病は口腔内の2大感染症である。 齲蝕発生においては、<u>Streptococcus nutans</u>

が重要な役割を果たしていることが知られて いる。一方、歯周病は、歯周病原性細菌の増 加、細菌の組織内侵入、それらの感染に対す る宿主応答の低下等がその要因となり得ると 考えられているが、正確な病因は完全には把 握されていない。しかし、歯周病患者の病巣 では、Bacteroides 密群、fusobacterium nucleatum 、 Eikenella corrodens 等のグラ ム陰性桿菌の増加が認められ、歯周病は、そ れらの感染症であることが示されつつある。

咽の炎症に関しては、各種のレンサ球菌が 関与し、中でも、Streptococcus pyogenesは、 溶血毒、ディック毒素、ストレプトキナーゼ、 DNA分解酵素等の毒素および酵素を産生す ることが知られており、各種の組織に化腺性 炎症を引き起こす。

したがって、歯周病や咽の炎症を予防・改 善するためには、これらの原因菌の生育を抑 えることが重要であり、有効な抗菌活性物質 の開発・応用が望まれる。また、そのような

抗菌活性物質は口腔内で使用されることから、 比較的安全性が高いと考えられる天然物であ ることが望ましく、しかも原料となる天然物 の品質が一定であることが望ましい。

これらの条件を踏まえ、銀意研究を行った 結果、ある種の植物抽出物が、歯周病原菌お よび咽頭内に存在する化膜レンサ球菌に対し てその生育を抑制する抗菌活性を示し、歯周 病に有効であることを突き止め、本発明を完 成するに至った。

### [発明が解決しようとする課題]

本発明は、天然植物起源の有効成分を含有する口腔用組成物であって、口腔内に存在する歯周病原菌や咽頭内に存在する化腺レンサ球菌に作用し、それらの細菌の生育を抑制して歯周病および咽の炎症の予防を図る口腔用組成物を提供することを目的とする。

#### 「課題を解決するための手段」

本発明によれば、歯周病および咽の炎症予防に有効な口腔用組成物であって、カッコウ

(Pogostemon cablin Bentham の地上部)から水蒸気蒸留により抽出した低極性物質を有効成分として含有することを特徴とする口腔用組成物が提供される。

カッコウは、Pogostemon cahlin Bentham の地上部であり、日本薬局方外生薬規格集 (厚生省薬務局審査課監修)にも掲載されて いる安全性の高い生薬である。主な用途とし ては、芳香性健胃薬として、食欲不振、消化 不良、暑気あたり等に効果があるとされてい

本発明による口腔用組成物は好適には水蒸気蒸留により抽出するが、低極性物質を効率よく抽出する他の方法も用いることができ、例えば溶剤抽出法等によることもできる。

水蒸気蒸留法においては、通常の蒸留装置を用いて水蒸気蒸留を行い、蒸留液を、 へキサン、石油エーテル等で抽出することにより、 本発明による有効成分を得ることができる。 溶剤抽出法における溶剤としては、 ヘキサ

ン、エーテル、酢酸エチル、アセトン、エタ ノール等の低極性物質を溶解可能な溶剤を使 用することができる。その他の抽出方法にお いては、通常用いられるいずれの方法を用い てもよい。

例えば、カッコウ2Kgを用いて水蒸気蒸留を行うと、本発明による有効成分が23g程度得られ、これは次のような性状を有する。

外観: 僅かに黄味を帯びた粘稠性の液体

比重: d 20 = 0.9526

屈折率: n 3° = 1.5072

比旋光度 [α] 3º = -6.67

酸価: 21.769

ケン化価: 52.623

水分: 0.16%

本発明による有効成分を、テューインガム、 キャンディー錠菓、練りハミガキ、含嗽剤等 に配合することにより、歯周病および咽炎症 予防効果を有する食品を提供することができ る。 本発明による有効成分を食品に添加する場合、最終濃度が0.0001~1.0 重量%となるように添加すれば好適である。この範囲より低い添加量で添加すると味覚上不適切となる。

#### [作用]

歯周病や咽の炎症の予防に有効な物質は既に 競力が知られているが、口腔用組成物としてこの種の物質を開発するに際しては、特に 安全性の観点から厳格な制限を考慮する必要がある。本発明の有効成分の起源を天然極物であるカッコウに求めたのはこの理由による。 カッコウはシソ科の植物であり、着香の目的で食品に添加する天然添加物として公的に使用が許可されている。

本出願人は、既にカッコウから所定の方法により抽出した抽出物が、カビおよび酵母を含む微生物に対して抗菌性を示すことを突き止め、抗菌性組成物としてこれに関する特許

出願を行っているが(特願昭63-118198号)、 同様のカッコウ抽出物が、歯周病や咽の炎症 の予防に有効であることを突き止め、本発明 を完成するに至った。この効果は、本出願に より始めて開示されたものである。

本が出した。 かっているでは、 ないのでは、 ないでは、 はいでは、 ないでは、 ないでな して用いる場合とでは、その作用は異なると 推定される。

## [発明の効果]

本発明によれば、天然植物起源の有効成分を含有する口腔用組成物であって、口腔内に存在する歯周病原菌や咽頭内に存在する化膜レンサ球菌に作用し、それらの細菌の生育を抑制して歯周病および咽の炎症の予防を図る口腔用組成物が提供される。

#### [実施例]

以下に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものではない。

まず、本発明による有効成分(カッコウ水 蒸気蒸留物)の歯周病原菌および化腺レンサ 球菌に対する抗菌活性を調べた。

試験培地として、次の2つの培地を用いた。 血液平板培地

Trypticase soy agar (BBL) 40 g Hemin (Sigma) 5 mg

Henadione (和光純菜)0.5 ng馬脱緞維血液 (コージン)100 nl蒸溜水900 nl

### **西** 体 懸 酒 用 液 体 培 地

Trypticase soy broth (BBL) 30 g
Hemin (Signa) 5 ng
Henadione (和光純菜) 0.5ng
蒸溜水 1000 nl

本発明による口腔用組成物の抗菌性試験は次のようにして行った。

常法により抽出したカッコウ水蒸気蒸留抽 出物のろ過減菌(ミリボアフィルタ、

HILLIPORE, 0.22mm)を行った後、2倍希釈系列で前記血液平板培地に添加し、試験用血液平板培地に添加的培養とした。細菌を接種した。生育した各々の細菌を少量の放射を持ている。生育した恐渇した。強力の対象をでは、変化を使用では、変化を変した。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を受ける。ない、変化を使いる。ない、20mmのでは、20mm

に歯体を接種し、4日間嫌気培養した。各議度の試験用血液平板培地におけるそれで配金で、MIC)を求めた。嫌気培養には嫌気がックスを用い、混合ガス(CO2:II2:N2=1:1:8)を注入し、37℃で培養した。試験結果を、歯周病原菌および化験レンサ球菌(咽炎症菌)に対する最少発育阻止濃度(MIC)として第1表に示す。

#### 第 1 表

苗 株	M I C (μg/n1)
齿周病関連細菌	
Actinomyces viscosus	313
ATCC 15987	
Actinomyces naeslundii	6 2 5
ATCC 12104	•
Actinomyces israelii	6 2 5
ATCC 12102	
Propionibacterium acnes	313
ATCC 11827	

Capnocytophaga gingivalis	625
ATCC 33624 Fusobacterium nucleatum	313
ATCC 25586 Eikenella corrodens	78
FDC 375 Fikenella corrodens	625
FDC 1073	156
Bacteroides gingivalis FDC 381	130
Bacteroides intermedius ATCC 25611	156
Bacteroides intermedius ATCC 33563	156
Bacteroides melaninogenicus	78
ATCC 25845 Bacteroides denticola	156
ATCC 33185 化 腸 レンサ 球 菌 ( 咽 炎 症 菌)	
Streptococcus pyogenes	625

				•	•	•
A i	I C	C	10	- 3	9	ŏ

Streptococcus pyogenes ADP 62

第1表に示したように、本発明による有効成分(カッコウ水蒸気蒸留物)は、歯周病原菌および化膿レンサ球菌に対して抑制作用を有し、特に歯周病原菌として最も有力視されているBacteroides 歯群に対して強い抑制作用を有することから、歯周病治療剤として有用であることが分る。

本発明による有効成分を、以下の実施例1 ~5に示すようにチューインガム、キャンディー、含嗽剤、練り歯磨、並びに錠薬に配合することにより、歯周病および咽炎症予防効果を有する食品を製造した。

## 実施例1 チューインガムの処方

成分	組成 (重量%)
ガムベース	20.0%
砂糖	55.0
グルコース	15.0
水飴	9.3

0.15

香料	0.5		100.0%
カッコウ水蒸気蒸留物	0.2	実施例4 練歯磨の処方	
	100.0%	<u>成</u> 分	组成(近景%)
実施例2 キャンディーの	処方	炭酸カルシウム	50.0%
<del>_</del> -	成(重量%)	グリセリン	20.0
砂糖	50.0%	カラゲーナン	0.5
水 飴	34.0	カルポキシメチルセル	ロース 1.0
クエン酸	1.0	ラウリルエタノールア	マイド 1.0
カッコウ水蒸気蒸留物	0.2	ショ糖モノラウレート	2.0
水	14.8	カッコウ水蒸気蒸留物	0.2
	100.0%	銅クロロフィリンナト	リウム , 0.1
実施例3 含嗽剤の処方		塩酸クロルヘキシジン	0.01
	成(重量%)	サッカリン	0.1
エタノール	30.0%		25.09
香料	1.0		100.0%
銅クロロフィリンナトリウ	۵.1 L	実施例5 錠菜の処方	
サッカリン	0.05	成分	组成(重量%)
塩酸クロルヘキシジン	0.01	砂糖	76.4%
カッコウ水蒸気蒸留物	0.2	グルコース	19.0

ショ糖脂肪酸エステル

68.64\_\_\_

# 特開平3-167132 (5)

カッコウ水蒸気蒸留物0.1水4.35100.0%

特許出願人

株式会社ロッテ

出關人代理人

井型士 浜田冶健